

УДК 681.5

# К ПРЕЦИЗИОННОЙ КАЛИБРОВКЕ УРАВНЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ КРУПНОГАБАРИТНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

**А.В. Данеев**

*Иркутский государственный университет путей сообщения*  
Россия, 664074, Иркутск, Чернышевского ул., 15  
E-mail: [daneev@mail.ru](mailto:daneev@mail.ru)

**А.В. Лакеев**

*Институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН*  
Россия, 664033, Иркутск, Лермонтова ул., 134  
E-mail: [lakeyev@icc.ru](mailto:lakeyev@icc.ru)

**В.А. Русанов**

*Институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН*  
Россия, 664033, Иркутск, Лермонтова ул., 134  
E-mail: [v.rusanov@mail.ru](mailto:v.rusanov@mail.ru)

**М.В. Русанов**

*Иркутский государственный университет путей сообщения*  
Россия, 664074, Иркутск, Чернышевского ул., 15  
E-mail: [rusanovmark@mail.ru](mailto:rusanovmark@mail.ru)

**Ключевые слова:** нелинейная дифференциальная реализация, теория Морса, юстировка идентифицированной модели.

**Аннотация.** На базе действия подобия, индуцированного матричными группами преобразований (полной линейной и специальной ортогональной), предложен метод построения оптимального апостериорного базиса в конфигурационном пространстве идентифицированной нелинейной дифференциальной модели демпфированных колебаний крупногабаритной космической конструкции; последнее означает минимизацию параметрического рассогласования между «эталонной» (проектно-расчетной) и идентифицированной моделями в классе систем, индуцированных групповыми преобразованиями. Результаты статьи имеют приложения в прецизионном апостериорном математическом моделировании (по данным натурных испытаний) уравнений адаптивной космодинамики, попутно генерируя теоретико-прикладные постановки для дифференциальной реализации сложных гиперболических систем.

## 1. Введение

Прецизионное моделирование нелинейной динамики крупногабаритных космических конструкций (ККК), собираемых на орбите, относится к числу наиболее важных и трудных проблем современной космодинамики, что обусловлено жесткими требованиями к точности ориентации и стабилизации большеразмерных космических аппаратов [1, 2]. Дифференциальные модели таких конструкций определяются их инерционными, же-

сткостными и диссипативными характеристиками, в связи с чем большую роль играют экспериментальные методы орбитального анализа, как линейных [3-5], так и нелинейных [6-8] моделей ККК-динамики. При этом современные методы апостериорного моделирования позволяют выбрать оптимальную структуру ККК-модели с целью формирования адаптивного контура ККК-стабилизации [1]. На языке качественной теории дифференциальной реализации термин «оптимальная» предполагает минимальную динамическую размерность (МДР) модели [6, 7] и ее прецизионную калибровку (относительно некоторой «эталонной» модели [9]) в классе подобных МДР-систем вида «объект-регулятор-наблюдатель», индуцированных матричными группами преобразований [10], над идентифицированной ККК-МДР-моделью.

## 2. Терминология и постановка задач прецизионной юстировки ККК-МДР-модели

Ниже приведем сведения из пространств модулей систем дифференциальной реализации, которые являются, по существу, лишь кратким списком обозначений, понятий и основных предварительных фактов, после чего сформулируем ряд задач по определению (вычислению) предпочтительной системы (в рамках задачи калибровки) динамической реализации на семействе подобных моделей «объект-регулятор-наблюдатель», индуцированных матричными группами преобразований. При этом по возможности теоретический акцент будет делаться на соответствие формальных МДР-моделей практической реальности [4, 5] (мотивирующие детали см. также во введении [9]).

Пусть, как обычно,  $M_{n \times m}(\mathbb{R})$  – множество всех  $n \times m$ -матриц над полем вещественных чисел  $\mathbb{R}$  (соответственно  $M_{n \times m}(\mathbb{C})$  – пространство матриц над полем комплексных чисел  $\mathbb{C}$ ),  $GL_n(\mathbb{R})$  – полная линейная группа степени  $n$  над  $\mathbb{R}$  и  $SO_n \subset GL_n(\mathbb{R})$  – специальная ортогональная группа; отметим, что группа  $GL_n(\mathbb{R})$  является неограниченным несвязным открытым  $n^2$ -многообразием, соответственно  $SO_n$  – связное компактное  $n(n-1)/2$ -многообразие (следствие 0.2.4 [10]); везде ниже верхний индекс « $T$ » молчаливо означает операцию матричного транспонирования.

Рассмотрим на временной полуоси  $[0, \infty) \subset \mathbb{R}$  уравнения (см. систему (2) [2]) углового движения ККК в виде нелинейной векторно-матричной дифференциальной МДР-системы второго порядка

$$(1) \quad \begin{aligned} d^2x(t)/dt^2 + Ddx(t)/dt + Ax(t) &= B_1u(t) + B_2\hat{u}(dx(t)/dt, x(t)), \\ y(t) &= C_1x(t) + C_2dx(t)/dt \end{aligned}$$

с состояниями  $x(t)$  в конфигурационном пространстве  $\mathbb{R}^n$ , программным управлением  $u(t) \in \mathbb{R}^m$ , вектор-функцией нелинейных связей  $\hat{u}(dx(t)/dt, x(t)) \in \mathbb{R}^q$  (возможно сформированной в парадигме «feedback»), выходами  $y(t) \in \mathbb{R}^p$  и матрицами соответствующих размерностей:

$$\begin{aligned} D, A &\in M_{n \times n}(\mathbb{R}), \quad B := (B_1, B_2) \in M_{n \times m}(\mathbb{R}) \times M_{n \times q}(\mathbb{R}), \\ C &:= (C_1, C_2) \in M_{p \times n}(\mathbb{R}) \times M_{p \times n}(\mathbb{R}); \end{aligned}$$

далее примем  $B \in M_{n \times (m+q)}(\mathbb{R})$ ,  $C \in M_{p \times 2n}(\mathbb{R})$ , при этом полагаем, что  $\text{rank } C = p$ .

Считаем, что система уравнений (1) получена *a posteriori* в результате минимальной дифференциальной реализации [3-7] некоторого фиксированного семейства управляемых процессов движения ККК. Это определяет матричную «модель-представление»

МДР-реализации, т.е. упорядоченную четверку  $(D, A, B, C)$  в виде фиксированной точки декартова пространства

$$\mathfrak{R}(\mathbb{R}) := M_{n \times n}(\mathbb{R}) \times M_{n \times n}(\mathbb{R}) \times M_{n \times (m+q)}(\mathbb{R}) \times M_{p \times 2n}(\mathbb{R}).$$

Переход к новому «апостериорному» базису в конфигурационном пространстве  $\mathbb{R}^n$  на базе трансформирующей матрицы  $S \in GL_n(\mathbb{R})$  изменяет координаты модели (1) по формуле  $z := Sx$  и преобразует уравнения (1) в эквивалентную им дифференциальную систему

$$(2) \quad \begin{aligned} d^2 z(t)/dt^2 + SDS^{-1} dz(t)/dt + SAS^{-1} z(t) &= SB_1 u(t) + SB_2 \hat{u}(S^{-1} dz(t)/dt, S^{-1} z(t)), \\ y(t) &= C_1 S^{-1} z(t) + C_2 S^{-1} dz(t)/dt. \end{aligned}$$

Уравнения (2) определяют [10] вещественно-аналитическое действие группы Ли  $GL_n(\mathbb{R})$  на множестве матричного представления дифференциальных систем (2) согласно правила

$$\begin{aligned} \rho_{GL} : GL_n(\mathbb{R}) \times \mathfrak{R}(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathfrak{R}(\mathbb{R}), \\ (S, (D, A, B, C)) &\mapsto \rho_{GL}(S, (D, A, B, C)) = (SDS^{-1}, SAS^{-1}, SB, (C_1 S^{-1}, C_2 S^{-1})), \end{aligned}$$

называемое *действием подобия* на  $n(2n + m + q + 2p)$ -многообразии  $\mathfrak{R}(\mathbb{R})$ .

Действие подобия  $\rho_{GL}$  задает на  $\mathfrak{R}(\mathbb{R})$  отношение эквивалентности  $\sim$ , а именно:

$$\begin{aligned} (D', A', B', C') &\sim (D, A, B, C) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \exists S \in GL_n(\mathbb{R}) : (D', A', B', C') &= (SDS^{-1}, SAS^{-1}, SB, (C_1 S^{-1}, C_2 S^{-1})). \end{aligned}$$

В этом положении классы эквивалентности

$$[D, A, B, C]_{GL} := \{(SDS^{-1}, SAS^{-1}, SB, (C_1 S^{-1}, C_2 S^{-1})) : S \in GL_n(\mathbb{R})\}$$

отношения  $\sim$  называются [10] *орбитами* действия  $\rho_{GL}$ . Фактор-пространство по отношению  $\sim$  называется *пространством орбит* действия  $\rho_{GL}$  и обозначается через

$$\mathfrak{R}^{GL}(\mathbb{R}) := \mathfrak{R}(\mathbb{R}) / GL_n(\mathbb{R}).$$

В пространстве орбит  $\mathfrak{R}^{GL}(\mathbb{R})$  имеется естественная топология [10], называемая фактор-топологией и являющаяся самой тонкой из всех возможных топологий на  $\mathfrak{R}^{GL}(\mathbb{R})$ , для которых непрерывно каноническое естественное отображение

$$\pi_{GL} : \mathfrak{R}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathfrak{R}^{GL}(\mathbb{R}), (D, A, B, C) \mapsto \pi_{GL}(D, A, B, C) = [D, A, B, C]_{GL}.$$

Пространство орбит называют [9] *пространством модулей* многообразия динамических систем минимальной (по индексу  $n$ ) дифференциальной реализации; по существу это означает, что его точки параметризуют орбиты действия  $\rho_{GL}$ .

Перечисленные конструкции переносятся на действие подобия  $\rho_{SO} : SO_n(\mathbb{R}) \times \mathfrak{R}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathfrak{R}(\mathbb{R})$  по специальной ортогональной группе  $SO_n$ ; можно показать [11, с. 120], что  $SO_n$  – связная компонента ортогональной группы  $O_n$ , при этом справедливо равенство  $SO_n = \cup \{U^k : k = 1, 2, \dots\}$ , где  $U$  – любая окрестность единицы в  $SO_n$  (см. п. (в) предложения 1 [11, с. 118]), в этом положении  $\mathfrak{R}^{SO}(\mathbb{R})$  хаусдорфово, отображение  $\pi_{SO}$  замкнутое (теорема I.3.1 [10]). Поэтому далее индекс «GL» (соответственно «SO») подтверждает действие группы  $GL_n(\mathbb{R})$  (соответственно  $SO_n$ ).

Рассмотрим матричнозначное отображение  $\eta_{GL/SO}$  и функционалы  $f_{GL}$ ,  $g_{SO}$  вида  $\eta_{GL} : GL_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R}), (S, A', A'') \mapsto \eta_{GL}(S, A', A'') := SA'S^{-1} - A'$ .

Фиксируя базовую терминологию, далее будем называть  $(A, \hat{A})$ -параметризованную матричнозначную функцию  $\eta_{GL}(\cdot, A, \hat{A}): GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ , где  $A \in M_n(\mathbb{R})$  и  $\hat{A} \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) \setminus \{(SAS^{-1}): S \in GL_n(\mathbb{R})\}$  заданы, GL-юстировкой матриц  $A, \hat{A}$  под действием подобия  $\rho_{GL}$ .

*Постановки задач:* для матрицы  $A$  реализации (1) и «эталонной»  $n \times n$ -матрицы позиционных сил  $\hat{A} \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) \setminus \{(SAS^{-1}): S \in GL_n(\mathbb{R})\}$  для модели (2) найти решения задач (a) – (c):

(a) в терминах жордановой  $A$ -структуры установить достаточные условия разрешимости задачи оптимизации GL-юстировки вида: существует матрица  $S^* \in GL_n(\mathbb{R})$ , для которой

$$\|\eta_{GL}(S^*, A, \hat{A})\| = \inf \{\|\eta_{GL}(S, A, \hat{A})\|: S \in GL_n(\mathbb{R})\};$$

(b) показать разрешимость задачи оптимальной SO-юстировки вида: для любой «эталонной» матрицы  $\hat{A} \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) \setminus \{(SAS^{-1}): S \in GL_n(\mathbb{R})\}$ , найдется такая матрица  $S^{**} \in SO_n$ , что

$$\|\eta_{SO}(S^{**}, A, \hat{A})\| = \inf \{\|\eta_{SO}(S, A, \hat{A})\|: S \in SO_n\};$$

(c) построить характеристическое уравнение для матрицы  $S^{**}$  задачи (b), где  $\|\cdot\|$  – евклидова норма ( $l_2$ -норма) в  $M_n(\mathbb{R})$ ; ниже используем факт  $\|S\|^2 = \text{tr}(S^T S)$ .  $\eta_{SO}(\cdot, \cdot, A''): SO_n \times M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$  – замкнутое отображение (теорема I.1.2 [10]).

Задачи (a)–(c) (и им подобные [4]) мотивируется определением через действие подобия  $\rho_{GL}$  «оптимальной» дифференциальной реализации (2) посредством калибровки идентифицированной ККК-МДР-модели (1) относительно некоторой «эталонной» модели; в частности, при  $\hat{A} = 0$  задачам (a), (b) отвечает выбор реализации (2) с минимальной  $l_2$ -нормой для  $SAS^{-1}$  [12]. С другой стороны, (d) отвечает вычислению начального приближения в схеме Ньютона–Канторовича [13, с. 669] при решении характеристического уравнения задачи (c), т.е. когда  $SAS^{-1}$  «SO-подгоняется» к эталонной матрице  $\hat{A}$  позиционных сил, не входящей в орбиту  $[D, A, B, C]_{SO}$ . Заметим, что в этих вопросах можно применять другие альтернативные подходы [14, с. 351].

### 3. Моделирование оптимального базиса конфигурационного пространства

При GL-SO-юстировке матрицы  $A$  системы реализации (1) знание геометрии пространства  $\mathfrak{R}^{GL-SO}(\mathbb{R})$  тесно связано с геометрией дифференциальных уравнений второго порядка [15, с. 57]. Поэтому ниже уточним некоторые орбитальные конструкции действия подобия  $\rho_{GL/SO}$ . Результаты этого раздела не претерпят качественных изменений при смене  $l_2$ -нормы в  $(M_{n \times n}(\mathbb{R}), \|\cdot\|)$  на любую матричную норму; полезные сопутствующие понятия см. в [11], а также § 30 из [15].

Везде далее  $\text{Pr}_A : \mathfrak{R}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{n \times n}(\mathbb{R})$  – оператор проектирования на второе координатное подпространство пространства  $\mathfrak{R}(\mathbb{R})$ . Очевидно, что для всякой матрицы  $\hat{A} \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  будет  $\text{Pr}_A \circ \pi_{\text{GL}}^{-1}([D, A, B, C]_{\text{GL}}) = \eta_{\text{GL}}(\text{GL}_n(\mathbb{R}), A, \hat{A}) + \hat{A}$ .

В данном контексте  $\eta_{\text{GL}}(\cdot, \cdot, \hat{A}) + \hat{A} : \text{GL}_n(\mathbb{R}) \times M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{n \times n}(\mathbb{R})$  – действие группы  $\text{GL}_n(\mathbb{R})$  на пространстве  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ , при этом  $\text{Pr}_A \circ \pi_{\text{GL}}^{-1}([D, A, B, C]_{\text{GL}})$  – гладкое (без края) подмногообразие в  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$  размерности  $n^2 - k$ , где  $k$  – размерность стабилизатора матрицы  $A$  или, что эквивалентно,  $k$  – размерность ядра кольцевого коммутатора  $S \mapsto (SA - AS) : \text{GL}_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_{n \times n}(\mathbb{R})$ .

Согласно следствия теоремы В.1.7 [11, с. 12] имеем (аналог теоремы Лагранжа):

$$\text{Card Pr}_A \circ \pi_{\text{GL}}^{-1}([D, A, B, C]_{\text{GL}}) = (\text{GL}_n(\mathbb{R}) : \text{GL}_n(\mathbb{R})_A),$$

где  $\text{GL}_n(\mathbb{R})_A$  – централизатор матрицы  $A$ , при этом  $\text{GL}_n(\mathbb{R})_A$  – замкнутая подгруппа без кручения в объемлющей группе  $\text{GL}_n(\mathbb{R})$  (теорема 2.6.3 [11, с. 117]).

**Теорема 1.** i) Для дефектной матрицы  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  многообразие  $\text{Pr}_A \circ \pi_{\text{GL}}^{-1}([D, A, B, C]_{\text{GL}})$  не замкнуто в пространстве  $(M_{n \times n}(\mathbb{R}), \|\cdot\|)$ ;

ii) для не скалярной  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  многообразие  $\text{Pr}_A \circ \pi_{\text{GL}}^{-1}([D, A, B, C]_{\text{GL}})$  не ограничено.

Если многообразие  $\text{Pr}_A \circ \pi_{\text{GL}}^{-1}([D, A, B, C]_{\text{GL}})$  не замкнуто (для реализации (1) с дефектной  $A$ ), то для  $\hat{A} \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) \setminus \text{Pr}_A \circ \pi_{\text{GL}}^{-1}([D, A, B, C]_{\text{GL}})$ , как предельной точкой для  $\text{Pr}_A \circ \pi_{\text{GL}}^{-1}([D, A, B, C]_{\text{GL}})$ , малое неустранимое «шевеление» ее элементов может привести к  $\hat{A} \in \text{Pr}_A \circ \pi_{\text{GL}}^{-1}([D, A, B, C]_{\text{GL}})$ . Однако заметим, что для задач [4, 5] конечномерных аппроксимаций нормально-гиперболических систем [3] (орбита  $[D, A, B, C]_{\text{GL}}$  такой модели содержит  $(D', A', B', C')$ , у которой  $D', A'$  – симметричные матрицы), достаточно следующего утверждения.

**Теорема 2.** i) Многообразие  $\text{Pr}_A \circ \pi_{\text{GL}}^{-1}([D, A, B, C]_{\text{GL}})$  замкнуто в  $(M_{n \times n}(\mathbb{R}), \|\cdot\|)$ , коль скоро матрица  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  диагонализуема в пространстве  $M_{n \times n}(\mathbb{C})$ ;

ii) для каждой орбиты  $[D, A, B, C]_{\text{SO}} \in \mathfrak{R}^{\text{SO}}(\mathbb{R})$  проекция  $\text{Pr}_A \circ \pi_{\text{SO}}^{-1}([D, A, B, C]_{\text{SO}})$  – компакт, являющийся образом канторова множества при некотором непрерывном отображении.

**Следствие 1.** При юстировке матриц

$$A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}), \hat{A} \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) \setminus \text{Pr}_A \circ \pi_{\text{GL}}^{-1}([D, A, B, C]_{\text{GL}})$$

существуют такие трансформирующие матрицы  $S^{**}, S^{***} \in \text{SO}_n$ , что верны

$$\|\eta_{\text{SO}}(S^{***}, A, \hat{A})\| = \sup \{ \|\eta_{\text{SO}}(S, A, \hat{A})\| : S \in \text{SO}_n \},$$

$$\|\eta_{\text{SO}}(S^{**}, A, \hat{A})\| = \inf \{ \|\eta_{\text{SO}}(S, A, \hat{A})\| : S \in \text{SO}_n \}.$$

Для недефектной матрицы  $A$  найдется  $S^* \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ , для которой будет

$$\|\eta_{\text{GL}}(S^*, A, \hat{A})\| = \inf \{ \|\eta_{\text{GL}}(S, A, \hat{A})\| : S \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) \}.$$

**Теорема 3.** Если порядок  $n$  конфигурационного пространства системы (1) нечетный, то многообразие  $\text{Pr}_A \circ \pi_{\text{GL}}^{-1}([D, A, B, C]_{\text{GL}})$  линейно связное.

#### 4. Характеристическое уравнение SO-юстировки

Следствие 1 решает вопрос существования матрицы  $S^{**}$  глобального минимума нормы SO-юстировки матриц  $A, \hat{A}$ , при этом задачу построения  $S^{**}$  можно проводить с опорой на теорию Морса [16, с. 265]. Ниже покажем, как данная теория, связывая геометрическое строение компактного линейно связного многообразия  $SO_n$  со свойствами стационарных точек функционала

$$S \mapsto \|\eta_{SO}(S, A, \hat{A})\| = \|SAS^{-1} - \hat{A}\| = \|SAS^T - \hat{A}\|, S \in SO_n,$$

аналитически выражает эту связь в виде матричного алгебраического уравнения относительно матрицы  $S^{**} \in SO_n$ , определяя необходимые условия для процесса SO-юстировки:

$$\|\eta_{SO}(S^{**}, A, \hat{A})\| = \inf \{ \|\eta_{SO}(S, A, \hat{A})\| : S \in SO_n \}.$$

Введем в рассмотрение  $(A, \hat{A})$ -параметризованный функционал  $\omega : SO_n \rightarrow \mathbb{R}$  вида  $\omega(S) := \text{tr}((SAS^T - \hat{A})^T (SAS^T - \hat{A}))$ .

Ясно, что стационарные точки функционалов  $\|\eta_{SO}(\cdot, A, \hat{A})\|$  и  $\omega(\cdot)$  совпадают, причем это те точки  $S \in SO_n$ , для которых проекция от  $\text{grad } \omega(S)$  на касательное пространство  $T_S SO_n$  образует нулевой вектор. Согласно лемме 19.3 [16, с. 279] это условие имеет компактный вид  $\text{grad } \omega(S) - S \text{grad } \omega(S)^T S = 0$ ;

данное уравнение назовем *характеристическим уравнением* SO-юстировки; таким образом, построение матричного уравнения для  $S^{**}$  свелось к вычислению вектора  $\text{grad } \omega(S) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $S \in SO_n$ .

Вводя в пространстве  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$  скалярное произведение  $\langle H, E \rangle = \text{tr}(H^T E) = \text{tr}(HE^T)$ , легко установить, что  $\text{grad } \text{tr}(X^T X) = 2X$ . Далее, пусть  $S \in SO_n$  и  $D(S) \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  – матрица, для которой при всех  $h \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  имеет место  $hAS^T = D(S)h^T$ . Тогда для обговоренных условий будет

$$\begin{aligned} & \| (S+h)A(S+h)^T \|^2 - \| SAS^T \|^2 = \text{tr}(((S+h)A(S+h)^T)^T ((S+h)A(S+h)^T)) - \| SAS^T \|^2 = \\ & = \text{tr}((S(AS^T + Ah^T) + h(AS^T + Ah^T))^T (S(AS^T + Ah^T) + h(AS^T + Ah^T))) - \| SAS^T \|^2 = \\ & = \text{tr}((SAS^T + SAh^T + hAS^T + hAh^T)^T (SAS^T + SAh^T + hAS^T + hAh^T)) - \| SAS^T \|^2 = \\ & = 2\text{tr}((SAS^T)^T (SAh^T)) + 2\text{tr}((SAS^T)^T (hAS^T)) + 2\text{tr}((SAS^T)^T (hAh^T)) + \\ & + 2\text{tr}((SAh^T)^T (hAS^T)) + 2\text{tr}((SAh^T)^T (hAh^T)) + \| SAh^T \|^2 + \| hAS^T \|^2 + \| hAh^T \|^2. \end{aligned}$$

Величина  $2(\langle SA^T A, h \rangle + \langle SA^T S^T D(S), h \rangle)$  представляет собой главную линейную (по  $h$ ) часть последнего выражения, следовательно, сильная и слабая производные от  $SAS^T$  равны  $2(SA^T A + SA^T S^T D(S))$ ,

откуда (с учетом дифференцирования сложной функции и  $\text{grad } \text{tr}(X^T X) = 2X$ ) приходим к  $\text{grad } \omega(S) = 4(SAS^T - \hat{A})(SA^T A + SA^T S^T D(S))$ .

Проведенные построения позволяют переписать уравнение (6) в развернутом виде

$$(SAS^T - \hat{A})(SA^T A + SA^T S^T D(S)) - S(SA^T A + SA^T S^T D(S))^T (SAS^T - \hat{A})^T S = 0;$$

данное уравнение можно решать методом Ньютона-Канторовича [13, с. 670].

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты №19-01-00301 и №19-08-00746).

## Список литературы

1. Rutkovsky V.Yu., Suchanov V.M., Glumov V.M. On control theory of large space structures assembled in orbit // Space Technology. Oxford: Lister Sci. Publ., 2010. P. 35-46.
2. Банщиков А.В. Исследование влияния управляющих сил на устойчивость спутника с гравитационным стабилизатором средствами компьютерной алгебры // Проблемы управления и информатики. 2018. № 4. С. 139-149.
3. Данеев А.В., Русанов В.А., Русанов М.В. От реализации Калмана–Месаровича к линейной модели нормально-гиперболического типа // Кибернетика и системный анализ. 2005. № 6. С. 137-157.
4. Дружинин Э.И. Построение структурно устойчивых моделей динамики больших космических конструкций по данным летных испытаний // Доклады РАН. 2017. Т. 479, № 3. С. 285-288.
5. Rusanov V.A., Bانشchikov A.V., Daneev A.V., Vetrov A.A., Voronov V.A. A posteriori simulation of dynamic model of the elastic element of satellite-gyrostap // Far East Journal of Mathematical Sciences. 2017. Vol. 101, No. 9. P. 2079-2094.
6. Коровин С.К., Крищенко А.П., Четвериков В.Н. Нелинейные отображения вход–выход и их минимальные реализации // Доклады РАН. 2010. Т. 434, № 5. С. 604-608.
7. Русанов В.А., Лакеев А.В., Линке Ю.Э. К разрешимости дифференциальной реализации минимального динамического порядка семейства нелинейных процессов «вход–выход» в гильбертовом пространстве // Дифференциальные уравнения. 2015. Т. 51, № 4. С. 524-537.
8. Rusanov V.A., Daneev R.A., Lakeyev A.V., Linke Yu.É. Differential realization of second-order bilinear system: a functional-geometric approach // Advances in Differential Equations and Control Processes. 2018. Vol. 19, No. 3. P. 303-321.
9. Rusanov V.A., Lakeev A.V., Linke Yu.E., Voronov V.A. On realization of dynamic systems: Assessment of fiducial accuracy in the process of adjustment of the realization matrix // Far East Journal of Dynamical Systems. 2014. Vol. 25, No. 1. P. 23-35.
10. Бредон Г. Введение в теорию компактных групп преобразований. М.: Наука, 1980. 440 с.
11. Бахтурин Ю.А. Основные структуры современной алгебры. М.: Наука, 1990. 320 с.
12. Rusanov V.A., Antonova L.V., Daneev A.V., Mironov A.S. Differential realization with a minimum operator norm of a controlled dynamic process // Advances in Differential Equations and Control Processes. 2013. Vol. 11, No. 1. P. 1-40.
13. Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ. М.: Наука, 1977. 744 с.
14. Глазман И.М., Любич Ю.И. Конечномерный линейный анализ. М.: Наука, 1969. 476 с.
15. Арнольд В.И. Геометрические методы в теории обыкновенных дифференциальных уравнений М.: МЦНМО, 2012. 384 с.
16. Прасолов В.В. Элементы комбинаторной и дифференциальной топологии. М.: МЦНМО, 2014. 360 с.